

**HRVATSKI |** Kendal hrani i jača biljke čime osigurava zdraviji rast i poboljšanje standarda kvalitete.  
**VRIJEME, NAČIN I DOZA PRIMJENE:**

Folijarno - na voću, povrću i ukrasnom bilju u dozi 1,5-3 l/ha (150-300 ml/100 l) u intervalima 7-10 dana; Fertirigacija - na voću, povrću i ukrasnom bilju u dozi 7,5-10 l/ha.

**UPOZORENJE:** Ne miješati s bakrom na kulturama osjetljivim na ovaj element.

**GNOJIVO NA BAZI MAGNEZIJA I KALCIJA OBOGAĆENO ORGANSKIM SASTOJECIMA.**

**SASTAV w/w (w/v):**

ukupni dušik (N), 3,5% (4,5%), organski dušik (N), 0,3% (0,4%); ureja dušik (N), 3,2% (4,1%), kalijev oksid (K<sub>2</sub>O) topiv u vodi 15,5% (20,0%), ukupna organska materija 6,0% (7,8%).

**FORMULACIJA:** tekuća.

Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuto na ambalaži.  
PROTRESTI PRIJE UPORABE.

U slučaju dugog skladištenja dobro protresti prije uzorkovanja i uporabe. Ne postoje problemi sa skladištenjem proizvoda pod uvjetom da se čuva na temperaturi između -0°C i +40°C.

Ako proizvod zahvati vatru, gasiti s puno vode.

Koristiti samo u slučaju prepoznate potrebe.

Ne prekoračiti preporučeno doziranje.

**POLSKI |** Aktywator naturalnej odporności. Odżywia i wzmacnia rośliny, powodując ich zdrowszy i lepszy jakościowy wzrost.

**ZAKRES I SPOSOB ZASTOSOWANIA, TERMINY, DAWKI:**

**Stosować:** - dolistnie: owoce, warzywa i rośliny ozdobne: 1,5-3L/ha (lub 150-300 ml/100L). - fertygacja: owoce, warzywa i rośliny ozdobne: 7,5-10L/ha.

**UWAGA:** Nie stosować łącznie z preparatami miedziowymi w uprawach wrażliwych na ten pierwiastek.

**NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY NK 3.5 15.5 W ZAWIESINIE ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW (w/w (w/v):** Azot całkowity (N): 3,5% (4,5%); azot organiczny (N): 0,3% (0,4%); azot amidowy (N): 3,2% (4,1%); tlenek potasu (K<sub>2</sub>O) rozpuszczalny w wodzie: 15,5% (20,0%); całość masy organicznej: 6,0% (7,8%).

**FORMULACJA:** płynna

Wprowadzony do obrotu na terytorium RP zgodnie z art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007 (Dz.U.Nr 147, poz.1033).

Wstrzasnac opakowaniem przed zastosowaniem.

Nie przekraczać zalecanych dawek.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od -0°C do +40°C, chronić przed nasłonecznieniem.

W przypadku długiego przechowywania należy dokonać starannej homogenizacji przed zastosowaniem.

**OMOGENEZZARE ACCURATAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DI OGNI PRELIEVO E PRIMA DELL'UTILIZZO.** Immagazzinato tra 0 e 40°C, il prodotto non presenta problemi di conservazione. In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.  
**THOROUGHLY MIX THE PRODUCT BEFORE USE.** If stored between 0 and 40°C the product does not have any storage problems. In case of fire use plenty of water.



MADE IN ITALY

# KENDAL

## 1L

1,22 Kg massa netta, net mass, neto masa, masa netto

**KENDAL, NUTRE E RINFORZA LE PIANTE PER UNA CRESCITA PIÙ SANA E L'OTTENIMENTO DEI MIGLIORI STANDARD QUALITATIVI.**

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO:**

Fogliare: frutticole, orticole ed ornamentali: 1,5-3 L/ha (o 150-300 ml/100L) trattamenti ogni 7-10 giorni; Fertirrigazione: frutticole, orticole, ornamentali: 7,5-10 L/ha.

**AVVERTENZE:**

non miscelare con rame su colture sensibili a questo elemento.

**CONCIME ORGANO-MINERALE.**

Concime organo-minerale NK 3,5-0-15,5 in sospensione.

**COMPOSIZIONE:**

Azoto (N) totale 3,5% P/P equivalente a 4,5% P/V; Azoto (N) organico 0,3% P/P equivalente a 0,4% P/V; Azoto (N) ureico 3,2% P/P equivalente a 4,1% P/V; Ossido di potassio (K<sub>2</sub>O) solubile in acqua 15,5% P/P equivalente a 20,0% P/V; Carbonio (C) organico di origine biologica 3,0% P/P equivalente a 3,9% P/V.

Componenti organici: Epitelio animale idrolizzato fluido.

Componenti inorganici: urea, sali misti potassici, sfidri potassici.

**FORMULAZIONE:** liquida

applicazione fogliare, foliar application, folijarna primjena, nawozenie dolistne

applicazione radicale, root application primjena na korijenu, zastosowanie do korzeni



 **Valagro**

Where science serves nature



## KENDAL

**ENGLISH |** KENDAL, feeds and reinforces plants for healthier growth and improving quality standards.

**TIMING AND RATE OF APPLICATION:** Foliar: fruits, vegetables and ornamentals: 1,5-3L/ha (or 150-300 ml/100L) treatments every 7-10 days.

Fertigation: fruits, vegetables and ornamentals: 7,5-10L/ha.

**CAUTION:** do not mix with copper on crops sensitive to this element

**Organo-mineral fertilizer NK 3.5-0-15.5 in suspension**

**COMPOSITION w/w (w/v):** T

otal nitrogen (N) 3.5% (45.0 g/L); Organic nitrogen (N) 0.3% (4.0 g/L); Ureic nitrogen (N) 3.2% (41.0 g/L); Potassium oxide (K<sub>2</sub>O) soluble in water 15.5% (200.0 g/L); Organic carbon (C) of biological origin 3.0 (39.0 g/L).

**FORMULATION:** liquid

Data di produzione - lotto di produzione: vedi stampa sulla confezione / Production date - production batch: see print on package / Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuti na ambalaži / Data proizvodnje - broj šarže: otisnuti na ambalaži / Data proizvodnje - broj šarže: otisnuti na ambalaži / Data proizvodnje - broj šarže: otisnuti na ambalaži

Il prodotto non è vendibile sfuso / Not to be sold in bulk / Ne prodavati u rinfuzi / Nie sprzedawac luzem.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'utilizzo / Dispose properly of packaging after use / Ne bacati u okruženje nakon upotrebe / Nie porzućac pojemnika w środowisku naturalnym po zastosowaniu.

Fabbricante, manufacturer, proizvođač, producent: **VALAGRO S.p.A.** Zona industriale, 66041 Atezza (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distributed in NZ by: **Valagro Pacific Ltd**, 727 Heretaunga St W, St. Leonards, Hastings 4120 - New Zealand | Tel (+64) 6 281 2137. Distributed in HR by: **AgroChem MAKŠ D.o.o.**, Kneza Borne 14, 10000 Zagreb - Hrvatska

Massa netta, net mass, neto masa, masa netto: **1,22 Kg** (1 l - 20°C).

 **Valagro**

Where science serves nature



4253209F87P1F9 00



valagro.com

