

MC SET



HRVATSKI

EC FERTILISER.

Mješavina mikronutritijenata, bor (B) (bor etanolamina) i cinka (Zn) (EDTA)

SASTAV w/w (w/v): boron topiv u vodi (B) 0,5% (6,05 g/L); cink topiv u vodi (Zn) 1,5% (18,1 g/L); cink (Zn) u helatiziranom EDTA obliku 1,5% (18,1 g/L). Cink u helatiziranom EDTA obliku stabilan je u rasponu pH 4- 11.

MC set formula temelji se na helatiziranom boronu i cinku. MC set namijenjen je cvjetnicama i vočkama.

NAČIN PRIMJENE I DOZIRANJE: Tretman listova: Plodonosne biljke: 1-2 L/ha (1-2 tretirati od cvatnje do opadanja latica). Povrtnice: 150-200 ml/100 L (1-2 tretmana od cvatnje do opadanja latica).

OBLIK: tekućina.

Proizvod čuvati pri temperaturama od 0°C do 35 °C.
U slučaju požara, upotrijebiti veliku količinu vode.

POLSKI

NAWÓZ WE. Mieszanina mikroskładników pokarmowych z borem (B) (boru etanolamina) i cynkiem, Cynk (Zn)(EDTA)

SKŁAD waga/waga (waga/objętość): Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,5% (6,05 g/L); Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 1,5% (18,1 g/L); Cynk (Zn) w postaci schelatowanej z EDTA 1,5% (18,1 g/L). Cynk (Zn) w postaci schelatowanej z EDTA, stabilne w zakresie pH 4-11.

MC set jest formułą na bazie boru i cynku chelatowanego. MC set wspomaga procesy kwitnienia i zawiązywania owoców.

DAWKI I SPOSÓB ZASTOSOWANIA: Stosować dolistnie: Drzewa owocowe: 1-2 l/ha (1-2 zastosowania od kwitnienia aż do czasu opadania płatków). Uprawy warzywne: 150-200 ml/100 l (1-2 zastosowania od kwitnienia aż do czasu opadania płatków).

FORMULACJA: płynna.

PRZECHOWYWANIE: Starannie wymieszać przed każdorazowym pobraniem i zastosowaniem. Produkt zachowuje stabilność przy przechowywaniu w temperaturze od 0°C do +35°C. W razie pożaru obejmującego produkt należy ugasić go obfitą ilością wody.

MC SET

FROM THE BEST OF THE SEA,
THE BEST OF THE EARTH

1,21 Kg massa netta, net mass, neto masa, waga netto

1L

CONCIME CE.
MISCELA DI MICROELEMENTI CON BORO (B)
(BORO ETANOLAMMINA) E ZINCO (Zn) (EDTA).

COMPOSIZIONE p/p (p/v):

Boro (B) totale: 0,5% (6,05 g/L); Boro (B) solubile in acqua: 0,5% (6,05 g/L); Zinco (Zn) totale: 1,5% (18,1 g/L); Zinco (Zn) solubile in acqua 1,5% (18,1 g/L); Zinco chelato EDTA: 1,5% (18,1 g/L).

Zinco chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 4-11.

MC set è un formulato a base di boro e zinco chelato.

MC set favorisce i processi di fioritura ed allegazione della pianta.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO:

Applicazione Fogliare: Frutticole: 1-2 L/ha (1-2 applicazioni dalla fioritura fino alla caduta dei petali). Orticole: 150-200 mL/100L (1-2 applicazioni dalla fioritura fino alla caduta dei petali).

FORMULAZIONE: liquida

Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto se immagazzinato a temperatura tra 0°C e 35°C non presenta problemi di conservazione. In caso di incendio in cui il prodotto venga coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.



applicazione fogliare, foliar application,
folijarna primjena, nawożenie dolistne

Valagro

Where science serves nature

MADE IN ITALY



ENGLISH

EC FERTILISER.

Mixture of micro-nutrients with boron (B) (boron ethanolamine) and zinc (Zn) (EDTA).

COMPOSITION w/w (w/v): Total boron (B): 0.5% (6.05 g/L); Water soluble boron (B): 0.5% (6.05 g/L); total zinc (Zn): 1.5% (18.1 g/L); water soluble zinc (Zn): 1.5% (18.1 g/L); Zinc EDTA chelated: 1.5% (18.1 g/L). Zinc chelated by EDTA is stable in the pH range 4-11.

MC set is a formulation based on chelated Boron and Zinc.

MC set favours flowering and fruit set.

TIMING AND RATE OF APPLICATION: Foliar treatment: Fruit trees: 1-2 L/ha (1-2 treatments from flowering to petal drop).

Vegetables: 150-200 mL/100 L (1-2 treatments from flowering to petal drop).

FORMULATION: liquid

If stored between 0°C and 35°C the product does not have any storage problems. In case of fire use plenty of water.

Usare solo in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate /To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate application rate /Koristiti samo u slučaju potvrđene potrebe. Ne prelaziti primjerenu količinu /Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek. Data di produzione - lotto di produzione: vedi stampa sulla confezione /Production date - production batch: see print on package /Datum proizvodnje i broj šarže: otisnuti na ambalaži /Data produkciji-partia towaru: zobacz wydruk na konfekcji. Il prodotto non è vendibile sfuso /Not to be sold in bulk /Ne prodavati u rinfuzi /Nie sprzedawać luzem.


Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'utilizzo /Dispose properly of packaging after use /Ne bacati u okruženje nakon upotrebe /Nie porzucac pojemnika w środowisku naturalnym po zastosowaniu.

Fabricante, manufacturer, proizvođač, producer: **VALAGRO S.p.A.** Zona industriale, 66041 Ateessa (CH) - Italy | Tel. (+39) 0872/8811. Distributed in NZ by: **AGRI TRADE**, 411 Blenheim Rd, Sockburn, Christchurch 8140, Ph 03 341 4587, Fax 03 341 4584, Free Phone 0800 333 855.

Massa netta, net mass, neto masa, waga netto: **1,21 Kg** (1 l - 20°C).

Valagro

Where science serves nature



4225409F87P1F9 02

valagro.com

8 031702 007945