

KARATETRAP C

Trappola insetticida pronta all'uso per il controllo del mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) con modalità Attract & Kill
Esca pronta all'uso (RB)
Meccanismo d'azione IRAC: 3A

COMPOSIZIONE

Lambda-cialotrina, 0,0075 g pura/trappola

Indicazioni di Pericolo:

(H315) Provoca irritazione cutanea.

(H319) Provoca grave irritazione oculare

(H410) Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti a lunga durata.

Informazioni Supplementari:

(EUH401) Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Consigli di Prudenza:

(P102) Tenere fuori dalla portata dei bambini.

(P261) Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/aerosol.

(P262) Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

(P270) Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

(P302 + P352) IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

(P280) Indossare guanti /proteggere gli occhi

(P305 + P351 + P338) IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

(P273) Non disperdere nell'ambiente.

(P391) Raccogliere la fuoriuscita.

(P501) Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente



ATTENZIONE

Titolare della registrazione: Probodelt, S.L., C/ Brasil 10-12, 2° 2ª 43870 Amposta, Tarragona – Spagna.

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A. Viale Fulvio Testi, 280/6– MILANO – Tel. 02-33444.1

Officine di produzione: Probodelt, S.L - Ctra. del Canal Amposta –Sant Jaume d'Enveja, km.1 43870 Amposta, Tarragona - Spagna

Registrazione Ministero della Salute n. 17984 del 11/02/2022

Contenuto netto: Confezioni contenenti 25 trappole pronte all'uso

PARTITA N°...

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Proteggere il prodotto dal congelamento. Indossare guanti adatti, certificati CE per sostanze chimiche, per tutte le operazioni di installazione, ritiro e smaltimento delle trappole. Lavare gli indumenti protettivi dopo l'uso. L'uso del prodotto può portare ad una diminuzione della popolazione dell'entomofauna utile (in particolare parassitoidi imenotteri Braconidae e Chalcidoidea e predatori Coccinellidae). Rimuovere le trappole al più tardi al momento del raccolto per evitare l'esposizione non necessaria di artropodi utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE:

KARATETRAP C è una trappola, contenente un'esca pronta all'uso, per il controllo del mosca della frutta (*Ceratitis capitata*) utilizzabile in varie colture, mediante la tecnica di Attract & Kill. La formulazione dell'esca attrattiva contiene specifiche esche alimentari per la cattura della mosca della frutta.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO:

COLTURA	AVVERSITA' COMBATTUTA	DOSAGGIO	EPOCA E NUMERO DI APPLICAZIONI
Agumi, tra cui arancia, mandarino (comprese clementine e ibridi), limone, pomelo e pompelmo	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	40/80 trappole ad ettaro	Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta. Una applicazione annuale
Drupacee, tra cui pesca, nectarina, ciliegia, albicocca e prugna	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	50/80 trappole ad ettaro	Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta. Una applicazione annuale
Pomacee, tra cui mele, pere e mele cotogne	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	50/80 trappole ad ettaro	Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta. Una applicazione annuale
Vite, comprese le uve da tavola e da vino	Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	50/80 trappole ad ettaro	Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta. Una applicazione annuale

Il numero di trappole per ettaro dipenderà dal livello di infestazione degli appezzamenti da proteggere, dalla densità di impianto e dalle dimensioni dell'area da trattare. Utilizzare una densità di trappole più elevata in caso di varietà più sensibili e in situazioni di elevati livelli di infestazione.

Le trappole **KARATETRAP C** devono essere posizionate circa 45 giorni prima della maturazione del frutto. Posizionare sull'albero a media altezza, nella parte sud-est dell'albero dove è presente una copertura fogliare maggiore, in modo che la trappola sia in posizione leggermente ombreggiata tra la vegetazione. Chiudere il gancio posto sul coperchio dopo aver posizionato la trappola sul ramo.

Disporre le trappole uniformemente nell'apezzamento, valutando se rafforzare l'area perimetrale (per storicità di pressione, appezzamenti adiacenti non trattati/abbandonati, sensibilità varietale; venti dominanti; etc.)

Monitorare con regolarità l'andamento delle catture delle trappole e le ovodeposizioni su frutto per valutare, in funzione del grado di infestazione, l'eventuale necessità di eseguire dei trattamenti insetticidi specifici

La trappola rimane efficace almeno 120 giorni a seconda delle condizioni meteorologiche – va comunque valutata la necessità di eseguire trattamenti insetticidi ausiliari in funzione della pressione del fitofago.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

È necessario applicare una Strategia di Gestione della Resistenza come:

In caso di applicazioni fogliari si consiglia di utilizzare insetticidi con un diverso meccanismo d'azione; insetticidi miscelati con esche proteiche; cattura massale; tecnica dell'insetto sterile (rilascio di maschi sterili) e buone pratiche agricole.

AVVERTENZE

Non usare **KARATETRAP C** se il contenitore in plastica risulta rotto o danneggiato o se il dispositivo proviene da confezioni non sigillate. Conservare i dispositivi nella confezione originale, in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. Non conservare a temperature superiori ai 40°C.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; da non applicare con mezzi aerei; operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato