

ERCOLE

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole
Meccanismo d'azione IRAC: 3A

ERCOLE - Composizione:

- Lambda-cialotrina pura g 0,4
 - Coformulanti ed inerti: quanto basta a g 100

**ATTENZIONE****TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

Sipcam Oxon S.p.A.
 Sede legale: via Carroccio 8
 20123 - Milano
 Tel. 02-353781

PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute
 n.15901 del 01.10.2013

Officina di produzione:

SIPCAM OXON SpA - Salerano sul Lambro (LO)
 SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna)
 Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Officina di confezionamento:

Kollant S.r.l. - Maniago (PN)
 Sinapak S.r.l. - Stradella (PV)

Distribuito da:

SIPCAM ITALIA S.p.A. - Via Sempione 195,
 20016 Pero Milano
 ITAL-AGRO S.r.l. - Salerano sul Lambro (LO)
 ORVITAL S.p.A. - via Darwin 63, Settimo
 Milanese (MI)

Taglie 0.25-0.45-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50
 Kg

Partita n.:**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Per proteggere gli uccelli il prodotto deve essere interamente incorporato nel terreno; assicurarsi che il prodotto sia completamente incorporato in fondo ai solchi. Rimuovere il prodotto fuoriuscito accidentalmente.

Utilizzare guanti, indumenti protettivi adatti e maschera respiratoria protettiva durante la fase di caricamento del prodotto. Utilizzare guanti e indumenti protettivi adatti durante la fase di applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando prepost-sinapticamente le terminazioni neuronali.

Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

(1) Periodo di autorizzazione dal 13 aprile 2021 al 10 agosto 2021

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorea, tosse, broncospasma e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveneni

CARATTERISTICHE

ERCOLE è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina.

La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali Noctuidae (*Agrotis spp.*, IAGROG), Elateridae (*Agriotes spp.*, IAGRIG), Diabrotica larvae (DIABSP).

MODALITA', DOSI E CAMPI DI IMPIEGO

ERCOLE si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10–15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:

Mais: localizzato alla semina alla dose di 10–15 kg/ha o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.

Patata: localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura alla dose di 10–15 kg/ha, per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.

Sorgo e Miglio

Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)

Soia**Cotone****Girasole**

Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e Zucchini)

Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)

Lattughe e insalate (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, Dolcetta, Barbarea, Senape juncea, Prodotti baby leaf comprese le brassicacee)

Spinaci e simili

Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri

Sedano, finocchio, cardo⁽¹⁾: localizzato alla semina alla dose di 15 kg/ha, per il controllo di Elateridi.

Fagiolino, pisello⁽¹⁾: localizzato alla semina alla dose di 15 kg/ha, per il controllo di Elateridi.

Colza**Carota****Tabacco**

Barbabietola da zucchero

Semi di papavero

Floreali ed ornamentali

Vivai di piante arboree

Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.

COMPATIBILITA'

Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 13 aprile 2021