



CENTURION PRO

CENTURION PRO è un erbicida sistemico di post-emergenza, selettivo, non residuale, per il controllo delle graminacee annuali e perenni in un'ampia gamma di colture a foglia larga. Dopo l'applicazione il formulato viene rapidamente assorbito dalle foglie delle infestanti trattate ed è prontamente traslocato al sistema radicale ed alle parti aeree della pianta in crescita.

COMPOSIZIONE Clethodim puro g 13 (120 g/L)

FORMULAZIONE Emulsione concentrata

INTERVALLO DI SICUREZZA 100 gg per girasole; 60 gg per soia e barbabietola da zucchero e da foraggio; 56 gg per patata e cipolla; 40 gg per carota.

N° DI REGISTRAZIONE 15868 del 28.03.2018

CONFEZIONE L 5

INDICAZIONI DI PERICOLO H304 - H336 - H411
EUH401 - EUH208 - EUH066



COLTURE	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSE (L/ha)	NOTE
 Girasole	Post-emergenza	1 - 3	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere fino a quella di 9 e più foglie vere
 Patata		1 - 3	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere della coltura e fino quando la vegetazione copre il 30% del terreno e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela.
 Carota		1 - 2	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie vere della coltura fino al raggiungimento del 50% del diametro di accrescimento della radice.
 Cipolla		1 - 2	Una sola applicazione/stagione dalla 2° foglia chiaramente visibile della coltura fino al 50% dell'accrescimento del bulbo.
 Barbabietola da zucchero e da foraggio		1 - 3	Una sola applicazione dalla fase di 2 foglie vere della coltura fino a quando la vegetazione copre il 30% del terreno e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela.
 Soia		1 - 2,5	Una sola applicazione/stagione dalla fase di 2 foglie fino a 9 o più foglie vere e prima che l'accrescimento della coltura impedisca un'adeguata penetrazione della miscela.

INFESTANTI CONTROLLATE:

Avena spp. (Avena selvatica), *Bromus spp.* (Forasacco), Ricacci di cereali, *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Giavoni), *Leptochloa spp.*, (Festuca fasciolata), *Lolium spp.* (Loietto), *Oryza spp.* (Oryza sativa), *Panicum spp.* (Falso panico), *Phalaris spp.* (Falaridi), *Poa spp.* (Fienarola), *Polypogon monspeliensis* (Coda di lepre), *Setaria spp.* (Setarie), *Cynodon dactylon* (Gramigna comune), *Paspalum distichum* (Panico acquatico), *Sorghum halepense* (Sorghetta).

- Ampio spettro d'azione: elevata efficacia su graminacee annuali e perenni
- Applicato in post-emergenza, garantisce una perfetta selettività sulle colture dicotiledoni
- Rapido assorbimento fogliare e traslocazione al sito d'azione
- Notevole velocità d'azione
- Non necessita di bagnanti, sono già inclusi nella formulazione

