

ALGOR® PLATIN

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento (tenero e duro) e l'orzo
Sospensione concentrata (SC)

100 g di prodotto contengono:

Diflufenican 3,4 g (= 40 g/l)
Clortoluron 50,8 g (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

Contiene 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one e 2-methyl-2H-isothiazole-3-one.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 – Sospettato di provocare il cancro. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



Nufarm Italia S.r.l.

Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)

Sede amministrativa: Bologna, Via Guelfa, 5, Tel 051 0394022

Officina di Produzione:

Nufarm SAS – Notre Dame de la Garenne – Gaillon (F);
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Registrazione n 13104 del Ministero della Salute del 29/03/2011

Contenuto netto: Litri 1 – 5 – 10 – 20

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti e tuta da lavoro. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECUZIONALI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni

CARATTERISTICHE

ALGOR® PLATIN è erbicida specifico per gli impieghi su frumento tenero, frumento duro ed orzo. La formulazione liquida in sospensione concentrata, lo rendono di facile manipolazione e impiego.

I principi attivi contenuti in **ALGOR® PLATIN** (diflufenican e clortoluron) offrono una azione erbicida complementare in grado di controllare le più importanti e diffuse infestanti graminacee e dicotiledoni delle colture sopra riportate.

Infestanti sensibili:

Graminacee: *Alopecurus myosuroides* (Coda di topo), *Apera spica venti* (Cappellini dei campi), *Lolium multiflorum* (Loglio Italoico), *Poa trivialis* (Spannocchina)

Dicotiledoni: *Anthemis arvensis* (Camomilla bastarda), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Cerastium arvense* (Peperina), *Lamium purpureum* (Falsa ortica), *Matricaria chamomilla* (Camomilla comune), *Papaver rhoeas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Ranunculus spp* (Ranuncolo), *Raphanus raphanistrum* (Ravanello selvatico), *Sinapis arvensis* (Senape), *Stellaria media* (Centocchio), *Thlaspi arvense* (Erba storna), *Veronica persica* (Veronica comune), *Viola spp.* (Viola del pensiero).

Infestanti mediamente sensibili

Graminacee *Phalaris brachystachys* e *P. paradoxa* (Falaridi), *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana).

Dicotiledoni *Galium aparine* (Attaccamani), *Fumaria officinalis* (Fumaria comune), *Chrysanthemum segetum* (Crisantemo dei campi), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galeopsis tetrahit* (Canapa selvatica) e *Polygonum convolvulus* (Convolvolo nero).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

ALGOR® PLATIN può essere applicato sia in pre- che in post-emergenza delle colture e delle infestanti, rispettando le seguenti modalità applicative:

- **In pre-emergenza, litri 2,75 – 3 per ettaro.** Per queste applicazioni, al momento dell'intervento il terreno deve essere ben preparato, livellato e privo di zolle.

Il seme della coltura deve essere ben coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3 - 4 cm).

- **In post-emergenza, litri 2,25 – 2,5 per ettaro.** In questo momento applicativo le infestanti graminacee quali *Avena fatua* (Avena selvatica), *Avena ludoviciana* (Avena ludoviciana), *Lolium*

multiflorum (Loglio italoico), *Phalaris brachystachys* e *Phalaris paradoxa* (Falaride), debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.

Per assicurare una buona copertura il prodotto va distribuito con un volume di acqua di 300-500 litri per ettaro.

Effettuare un solo trattamento per ciclo colturale

COMPATIBILITA' – Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITA'- Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora una abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle piantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono. A questa temporanea sensibilizzazione è particolarmente soggetto l'orzo. In tutti i casi non si evidenziano tuttavia ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture. Non impiegare il prodotto sulle varietà di frumento Kid, Demar 4 e Brasilia.

Sospendere il trattamento 84 giorni prima del raccolto.

AVVERTENZA: Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti. Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale. Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle leguminose. Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali;

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI –

NON OPERARE CONTRO VENTO –

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE

SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE

ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

NON PULIRE IL MATERIALE DI APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

© Marchio registrato Nufarm