

**BORNEO®****(SOSPENSIONE CONCENTRATA)  
ACARICIDA OVO-LARVICIDA  
Meccanismo d'Azione: IRAC 10B**

BORNEO Registrazione del Ministero della Salute n.12859 del 20/10/2005

**COMPOSIZIONE:**Etoxazole puro g 10,68 (=110 g/L)  
Coformulanti q. b. a g 100

© Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):

ISAGRO SpA - Aprilia (LT)

SBM - Formulation - Beziérs Cedex (Francia)

Althaller Italia - 20078 S. Colombano al Lambro (MI)

Stabilimenti di confezionamento:

Bayer CropScience Srl - 24044 Filago (BG)

IRIS - 1126 A, Avenue de Moulinas - Route de St Privat

30340 Salindres (Francia)

TARGET S.A. - Kartoszyo, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa (Polonia)

**ATTENZIONE**

Partita n.

Contenuto: 5-10-20-25-40-50-100-200-250-500 mL 1-5-10-25 L

**SUMITOMO CHEMICAL AGRO  
EUROPE S.A.S.****10A Rue de la Voie Lactée  
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or (Francia)  
Tel. +33 478643260**

Distribuito da:

**SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl**

Via Caldera, 21 - Milano - Tel. 02.45280.1

**BAYER CROPSCIENCE Srl**

Viale Certosa, 130 - 20156 - Milano - Tel. 02.39721

**SBM Life Science Srl**

Via Montefeltro 6, 20156 Milano Tel. 02/83968856

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.****CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.****PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.****REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.****CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.****SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI****Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Prima di rientrare nelle serre trattate, ventilare a fondo fino a che la vegetazione non sia completamente asciutta.****INFORMAZIONI MEDICHE****In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.****CARATTERISTICHE**

BORNEO è un acaricida ovo-larvicida specifico per impiego su colture floreali ed ornamentali in serra.

Svolge azione per contatto ed è dotato di persistenza e selettività. È estremamente efficace contro le forme giovanili di ragnetto rosso e giallo.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO****COLTURE ORNAMENTALI E FLOREALI** (in serra): contro il ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*), il ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*) intervenire alla comparsa delle prime forme mobili alla dose di **25-50 ml/ha** (corrispondente a 250-500 ml/ha). E buona pratica agricola al primo utilizzo effettuare test preliminari su alcune piante per verificare che, nelle condizioni di utilizzo, non si verifichino effetti indesiderati.**Effettuare un solo trattamento per stagione.**

Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere.

**Per il controllo delle forme giovanili in primavera si raccomanda di impiegare BORNEO da solo. In caso di presenza di adulti, comunque BORNEO può essere impiegato in miscela con un adalticida.****Preparazione della miscela:** Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.**COMPATIBILITÀ****Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**CONSERVARE IN AMBIENTE FRESCO, ASCIUTTO E BEN VENTILATO****NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E  
BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO****IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**