

# TRIMAXX®

Regolatore di crescita per il frumento, orzo,  
segale, triticale  
CONCENTRATO EMULSIONABILE

## TRIMAXX

Registrazione Ministero della Salute n 16191 del 21.04.2015

### Composizione

100 g di prodotto contengono:  
TRINEXAPAC-ETHYL puro 18.22 g (175 g/l)  
Coformulanti q.b.a 100 g

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H373 - Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 - Non respirare i vapori / gli aerosol. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P314 - In caso di malessere, consultare un medico. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.



**ATTENZIONE**

NUFARM Italia S.r.l. - Viale Luigi Majno 17/A - 20122 Milano; sede amm.va via Guelfa 5 - 40138 - Bologna.  
Tel. 051 0394022

Stabilimenti di produzione:

Adama Agan Ltd. P.O.B. 262 - 77102 Ashdod (Israele)

Adama Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna)

Nufarm S.A.S., Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon (Francia)

Stabilimento di confezionamento:

Chemark Kft. - 8182 Peremarton - Ungheria

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Sumitomo Chemical Italia S.r.l., Via Caldera, 21 - 20153 - Milano (MI). Tel. 02 452801

Contenuto: 0,5- 1 - 5 - 15- 20 l Partita n.

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile una fascia di rispetto non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione non risulti completamente asciutta.

Durante le operazioni di miscelamento, carico ed applicazione indossare guanti adatti.

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

### CARATTERISTICHE

TRIMAXX è un regolatore di crescita a base di Trinexapac-etile che, attraverso una temporanea riduzione dell'allungamento delle cellule e perciò del culmo, porta ad una riduzione della lunghezza degli internodi ed un conseguente incremento del controllo dell'allettamento.

### COLTURE, DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

**FRUMENTO e TRITICALE:** eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,5 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,25 l/ha**, con un intervallo di 6-15 giorni tra i trattamenti. Per frumento eseguire le applicazioni tra le fasi di inizio levata e raggiungimento della lunghezza massima del fusto; per triticale eseguire le applicazioni tra le fasi di 1° nodo distinguibile e 3° nodo distinguibile. Impiegare un volume d'acqua tra 100 e 400 l/ha.

**ORZO:** per orzo primaverile eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,6 l/ha** o 2 applicazioni/anno alla dose di **0,3 l/ha**;

per orzo invernale: 1 applicazione all'anno alla dose di **0,8 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,4 l/ha**. In caso di 2 applicazioni rispettare un intervallo tra le applicazioni di 6-15 giorni. Eseguire le applicazioni tra le fasi di inizio levata e raggiungimento della lunghezza massima del fusto. Impiegare un volume d'acqua compreso tra 100 e 400 l/ha.

**SEGALE:** eseguire 1 applicazione all'anno alla dose di **0,5 l/ha** o 2 applicazioni all'anno alla dose di **0,25 l/ha**. In caso di 2 applicazioni rispettare un intervallo tra le applicazioni di 6-15 giorni. Eseguire le applicazioni tra le fasi di 1° nodo distinguibile e 3° nodo distinguibile. Impiegare un volume d'acqua compreso tra 100 e 400 l/ha.

Applicare il prodotto in fase di post-emergenza della coltura.

Per tutti gli impieghi autorizzati è consentito un numero massimo di 2 trattamenti all'anno.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 70 GIORNI PER FRUMENTO E ORZO INVERNALE; 50 GIORNI PER L'ORZO PRIMAVERILE; 60 GIORNI PER TRITICALE E SEGALE**

### FITOTOSSICITÀ

Limitare fenomeni di deriva su colture orticole adiacenti.

**Attenzione:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 21/09/2018 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 22/11/2022