



SUPER ROBUR®

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (SO₃)
CON FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

- Specifico per le concimazioni di copertura, di presemina o pretrapianto, nonché per il risveglio primaverile o alla ripresa vegetativa, per le **colture arboree e pluriennali**.
- Per ottenere un naturale accrescimento delle colture con un perfetto equilibrio vegeto-produttivo.
- Contiene **Azoto a rilascio graduale** e **Fosfomato**.



CARATTERISTICHE

SUPER ROBUR® si caratterizza per l'elevato contenuto in **Azoto** (disponibile nelle forme organica, ureica ed ammoniacale) e per l'adeguata quantità di **Fosforo e Potassio**.

Il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati), **Ferro e Zinco**, intimamente combinati con le matrici organiche del concime e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. L'alto contenuto in **Zolfo** organicato consente, tra le altre cose, una rimobilizzazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un'ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.



Applicazione al terreno

4-10
q/Ha

Dose media d'impiego



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale	15,0%
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 11,5% - ureico 2,5%	
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) Totale	5,0%
di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5,0% - solubile in acqua 3,0%	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) Solubile in acqua	5,0%
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃) Totale	26,0%
di cui: solubile in acqua 13,0%	
FERRO (Fe) Totale	0,5%
ZINCO (Zn) Totale	0,01%
CARBONIO ORGANICO (C)	7,5%
CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA)	3,0%
TASSO DI UMIFICAZIONE (HR)	40,0%



COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.



COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto NP, solfato potassico, cloruro potassico.



FORMULAZIONE

Granulare.



CONFEZIONI

kg 25 - kg 600



COLTURE

MELO, PERO
PESCO
ACTINIDIA
VITE
NOCCIOLO
GRANO TENERO E DURO
MAIS
INSALATA, LATTUGA, RADICCHIO
SPINACIO
SEDANO
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA,
ZUCCHINO, CAROTA, RAPA, CAVOLO RAPA
ERBA MEDICA, FORAGGERE



PERIODO APPLICAZIONE

Fine inverno
Fine inverno
Fine inverno
Fine inverno
Fine inverno
Prima della levata
Sarchiatura
Presemina o pretrapianto
Presemina
Pretrapianto
Presemina, pretrapianto e copertura
Fine inverno o dopo il primo taglio



DOSE

4-6 q/Ha
5-8 q/Ha
5-7 q/Ha
5-7 q/Ha
4-6 q/Ha
2-5 q/Ha
7-10 q/Ha
4-8 q/Ha
6-10 q/Ha
4-8 q/Ha
6-10 q/Ha
4-8 q/Ha