



STABILAN®

FITOREGOLATORE

STABILAN® FITOREGOLATORE LIQUIDO SOLUBILE

Autorizzazione Ministero della
Salute n° 13792 del 21/12/2010

COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono: CLORMEQUAT puro g 41,2 (461 g/l).
Coformulanti q.b. a g 100. Contiene Cloruro di colina.

Ragione sociale e sede della ditta titolare della registrazione: **NUFARM Italia Srl**, Viale Luigi Majno 17/A Milano
Sede operativa: Via Guelfa 5, Bologna (BO) - Tel.: 051 0394022

Officina di produzione: **NUFARM GmbH & Co KG** - St. Peter-Strasse 25-A-4021 Linz (Austria)

Distribuito da: **COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.** - Succursale Italia:
Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (Milano) Tel: +39 02 0996 6107

INDICAZIONI DI PERICOLO: H290 Può essere corrosivo per i metalli. H302 Nocivo se ingerito. H312 Nocivo per contatto con la pelle. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P234 Conservare soltanto nel contenitore originale. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti, indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P301 + P312 In caso di ingestione accompagnata da malestere: contattare un centro antiveneni o un medico. P302 + P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P330 Sciacquare la bocca. P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PARTITA N.:
Vedi corpo della confezione

CONTENUTO NETTO:

1 L
(12 x 1L)

© marchio registrato NUFARM



COMERCIAL QUÍMICA MASSO, S.A.
Viladomat, 321, 5° - 08039 Barcelona (España)
Tel: +34 93 495 25 00 - E-mail: masso@cqmasso.com

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del
23/11/2012 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23/12/2020.

STABILAN®

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare occhiali protettivi, guanti, tuta da lavoro, stivali o scarpe antinfortunistiche. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione non chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione, ed in caso di contaminazione, lavare accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: irritazione per cute e mucose; effetti anticolinesterasici riscontrati nell'animale da esperimento con contrazioni tonico-cloniche e depressione respiratoria. Terapia: sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE STABILAN® è un regolatore di crescita che ostacolando temporaneamente la formazione delle sostanze che determinano l'allungamento delle cellule e quindi l'accrescimento, induce un minor sviluppo in lunghezza dei culmi e dei germogli, favorisce la formazione di piante più resistenti alle avversità ambientali e parassitarie ed esalta la capacità produttiva della coltura, in quanto contenendo lo sviluppo vegetativo favorisce la fase riproduttiva. STABILAN®, oltre al principio attivo clormequat, contiene cloruro di colina, sostanza normalmente impiegata come antidoto in caso di intossicazione da CCC. Questo composto determina una minore pericolosità per l'utilizzazione durante la manipolazione e distribuzione del prodotto.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Grano tenero: 2-3 l/ha

Grano duro: 2,5-3,5 l/ha. Trattamento per via fogliare allo stadio di fine-accestimento-inizio levata.

Segale: 2-3 l/ha. Trattamento all'inizio della fase di levata.

Avena: 2-3 l/ha. Trattamento nella fase in cui la spiga si rende evidente sul culmo (piante di 40-50 cm di altezza).

Orzo: 3-4 l/ha. Trattamento nella fase di accestimento-inizio levata.

Piante ornamentali e da fiore: STABILAN® viene impiegato in floricoltura per ottenere piante più basse e compatte, steli più vigorosi e resistenti ai marciumi, foglie e fiori di colorazione più intensa, fioritura più precoce e formazione di un maggior numero di fiori. / **Stella di Natale:** 0,15-0,25% dopo la spuntatura 2-3 interventi a distanza di circa 14 giorni. / **Geranio:** 0,1-0,15% dopo la spuntatura 1-2 interventi a distanza di 14 giorni. / **Begonia:** 0,1% dopo il radicamento nel vaso definitivo. / **Crisantemo:** 0,25%, 15 giorni dopo la cimatura 1-2 trattamenti a distanza di 14 giorni. / **Kalanchoe:** 0,5 - 1% intervenendo alla fine del trattamento a foto-periodo breve.

FITOREGOLATORE

COMPATIBILITÀ: STABILAN® è miscelabile con i diserbanti (i fungicidi e i concimi fogliari previsti per i cereali). I prodotti dovranno essere miscelati nel serbatoio dell'irroratrice immediatamente prima della distribuzione.

FITOTOSSICITÀ: STABILAN® è selettivo verso le leguminose foraggiere consociate al frumento. Su piante giovani di erba medica il prodotto può procurare lievi ustioni fogliari, che risultano, peraltro, di rapida soluzione. Si sconsiglia l'impiego di STABILAN® su seminati sofferenti per carenze nutrizionali e avversità ambientali o parassitarie. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON OPERARE CONTRO VENTO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE E CORSI D'ACQUA.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.