

# ACUPRICO 76 WG

MICROGRANULARE IDROSOSPENSIBILE

FUNGICIDA ORGANICO PER TRATTAMENTI LIQUIDI IN FRUTTICOLTURA

ACUPRICO 76 WG

PERICOLO

## Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

- Ziram puro g 76

- Coformulanti q.b. a g 100

UFI: 3N1N-HU4G-EX0Q-SSWW

## Indicazioni di pericolo

**H302** Nocivo se ingerito. **H330** Letale se inalato. **H317**

Può provocare una reazione allergica cutanea. **H318**

Provoca gravi lesioni oculari. **H373** Può provocare

danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

## Consigli di prudenza

**P260** Non respirare gli aerosol. **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

**P304+P340** IN CASO DI INALAZIONE: trasportare

l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. **P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P333+P313** In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

## Titolare della registrazione

EASTMAN ITALIA S.r.l.

presso Studio Tributario Societario, Via Matteo Bandello 5-20123 Milano – Tel.: 335 8135202

Distribuito da: UPL Italia S.r.l. – Via Terni, 275 S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Officina di produzione: TAMINCO BV Pantserschipstraat, 207- GENT (Belgio)

Officine di confezionamento: Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE); STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Sanità n° 0599 del 17/02/1972

Contenuto netto: kg 1 – 5 – 10 – 20

Partita n. ....



## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporefflessia.

**Effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza. **Terapia:** sintomatica.

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Dosi d'impiego:** dose massima 3 kg/ha

**Melo:** contro ticchiolatura fino a fine fioritura: 180-250 g/hl;

**Pero:** contro ticchiolatura e maculatura bruna: 180-250 g/hl;

**Nespolo:** contro ticchiolatura: 180-250 g/hl;

**Pesco:** contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;

**Ciliegio, Susino:** contro corineo per trattamenti autunno-vernini fino a fine fioritura: 200-450 g/hl;

**Mandorlo:** contro bolla e corineo per trattamenti autunno-vernini: 200-450 g/hl;

Sono ammessi massimo 4 trattamenti per melo, pero e nespolo, massimo 3 trattamenti per le altre colture. Non superare i 2 trattamenti dopo la fioritura.

**N.B.:** Utilizzare 5-12 hl di acqua per ettaro con pompa a volume normale. Intervello minimo tra i trattamenti 7-14 giorni.

## COMPATIBILITÀ

ACUPRICO 76 WG è miscibile con gli antiparassitari ad azione neutra. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

## FITOTOSSICITÀ

Le varietà di pero Spadona d'estate, Spadoncina, Coscia, Gentil bianca, Gentilona, Cannellina, si sono dimostrate sensibili e non devono essere trattate con ACUPRICO 76 WG. Le varietà di pesco del gruppo Red Haven sono sensibili allo ziram.

**Sospendere i trattamenti: 150 giorni prima della raccolta delle mandorle, 60 giorni prima della raccolta di pere e nespolo.**

## ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente