



U46[®] ULTRA

DISERBANTE SELETTIVO



Etichettatura ambientale

U46[®] ULTRA

DISERBANTE SELETTIVO PER FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO, MAIS, SORGO, MELO E PERO
LIQUIDO SOLUBILE. - MECCANISMO DI AZIONE: GRUPPO O (HRAC)

COMPOSIZIONE:

DICAMBA PURO g 1,96 (= 21,8 g/l) (corrispondente a g 2,36 = 26,2 g/l di sale dimetilamminico)
MCPA PURO g 21,66 (= 240,4 g/l) (corrispondente a g 24,9 = 276,4 g/l di sale sodico-potassico)
COFORMULANTI q.b. a g. 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDICAZIONI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P337+ P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P391 Raccogliete i fuoriusciti. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

Titolare dell'autorizzazione:
NUFARM Italia S.r.l., Via Luigi Majno 17/A Milano (Italia)
Sede amministrativa ed operativa Via Gueffia, 5 Bologna (BO)
Tel. 051 0394022

Distribuito da:
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A., Succursale ITALIA:
Viale Marelli, 132, 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
Tel. +39 02 0996 6107

Officina di produzione:
NUFARM GmbH & Co KG,
St. Peter-Strasse 25 - A
4021 Linz (Austria)

Partita N.: Veder-Genetec

CONTENUTO NETTO
1 litro

Registrazione Ministero della Salute
n. 15335 del 23/01/2012

UFI: T692-QH8E-KGA5-493P



ATTENZIONE



COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.
Viladomat, 21, 5 - 08029 Barcelona (España)
Tel. +34 93 29 29 00 - E-mail: masso@comqmasso.com -
info@comqmasso.com



Etichetta autorizzata con DD del 23/06/2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 23/12/2020

U46[®] ULTRA

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nelle zone trattate prima di 48 ore. Per lavorazioni agricole da effettuare entro 10 giorni, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione delle piante non bersaglio, lasciare una zona non trattata di 5 m dalle zone adiacenti non coltivate (mais, sorgo).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: DICAMBA; MCPA le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA - Sintomi: Irritazione oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica. MCPA - Sintomi: Irritazione per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; Irritazione oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: Vertigini, atassia, parestesia, neurite neuropatia periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: Dolenza, rigidità, fascicolazione; gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. **Consultare un Centro Antiveneni.**

MODALITÀ DI IMPIEGO

U46[®] ULTRA è una miscela di erbicidi selettiva per il diserbo di melo, pero, frumento, mais, sorgo e cereali minori: avena, segale, orzo. L'aggiunta del Dicamba ad un derivato fenossiacetico (MCPA) amplia lo spettro di efficacia dell'U46[®] ULTRA e consente di ottenere controlli anche su infestanti notoriamente resistenti ai derivati fenossiacetici.

In particolare si consiglia l'impiego dell'U46[®] ULTRA ove esistono infestazioni di erbe annuali e perenni a foglia larga quali:

- **Infestanti sensibili:** Amaranto (*Amaranthus retroflexus*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Arenaiola (*Spergula arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), Brasica spp., Borsa del Pastore (*Capsella bursa pastoris*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Erba Calderina (*Senecio vulgaris*), Erba storna (*Thlaspi arvense*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Galinsoga comune (*Galinsoga parviflora*), Grespino dei campi, Cicerbita (*Sonchus* spp.), Papavero (*Papaver rhoeas*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Poligono (*Polygonum convolvulus*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Rapastrella (*Raphanus raphanistrum*), Romice (*Rumex* spp.), Senape (*Sinapis arvensis*), Stellaria (*Stellaria media*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Veccia (*Vicia sativa*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*).

- **Infestanti mediamente sensibili:** Attaccamano (*Galium aparine*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Portulaca (*Portulaca oleracea*), Tarassaco (*Taraxacum officinalis*), Veronica (*Veronica* spp.).

DISERBANTE SELETTIVO

EPOCA E DOSI DI IMPIEGO

- **FRUMENTO, AVENA, SEGALE, ORZO:** 3-3,25 l/ha in 400-600 litri d'acqua dalla fine dell'accestimento sino all'inizio della fase di batticella. Numero massimo di trattamenti 1.
- **MAIS, SORGO:** 0-0,5 l/ha in 400-600 litri di acqua. Si consiglia di intervenire nelle ore più fresche della giornata, con temperature comprese tra 10° e 12°C e su mais tra la 3a e la 4a foglia. Numero massimo di trattamenti 1.
- **MELO, PERO:** 3-3,25 l/ha in 400-600 litri di acqua con infestanti in fase di attiva crescita. Trattare con temperature miti, nei periodi di stasi vegetativa della coltura e con l'ausilio di barre schermate. Bagnare uniformemente la vegetazione infestante. È consigliabile l'aggiunta di olio bianco (1 - 2%). Numero massimo di trattamenti 2.

COMPATIBILITÀ: U46[®] ULTRA non è miscibile con i prodotti a reazione alcalina. In caso di miscele con graminicidi, controllare le restrizioni di impiego relative ai graminicidi stessi.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può danneggiare colture sensibili quali la vite, alberi da frutto, ortaggi ecc. anche sotto forma di vapori portati dal vento. Data la tossicità del principio attivo MCPA per l'erba medica, trattare almeno 15 giorni prima della semina.

AVVERTENZA AGRONOMICA: per prevenire la comparsa di infestanti resistenti si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

INTERVALLO DI SICUREZZA: 80 giorni su melo e pero. Per i cereali in base all'epoca di trattamento. Su mais e sorgo non impiegare dopo lo stadio 3-4 foglie.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

